

Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adhuc non satis cognitae.

Auctore

Carl Mez.

I. Bromeliaceae.

Bromelia Glaziovii Mez n. sp.; foliis super vaginam haud angustatis; inflorescentia contracte paniculata percompacte subcorymbosa, caule brevi per anthesin super foliorum rosulam elata; bracteolis florigeris quam ovaria multo longioribus sepala aequantibus vel paullo superantibus, late elliptico-linearibus, apice rotundatis, carinatis; petalis glabris; ovario tomento denso, pallido vel albo, lanuginoso oblecto.

Rosulae folia basi in vaginam brevem, triangularem, infime praesertim dorso lepidibus magnis palaeaceis brunneis oblectam, margine imprimis ad apicem laciniöse serratam vel serrato-spinosam dilatata, perrigida, a basi ad apicem validissime pungentem persensim angustata margine spinis retro (nec! sursum) uncinatis, usque ad 3 mm longis, brunnis horrida, recurvata et sicca longitudinaliter complicata, ad 300 mm longa, medio vix ultra 12 mm lata, adulta utrinque glabrata vel subtus membrana tenui pallida e lepidibus formata oblecta; folia suprema ad inflorescentiae basin posita e vagina maxima, purpureo-rosea (ex cl. GLAZIOU!), inflata, dorso dense albo-lepidota fere tomentella, margine praesertim ad apicem serratim spinosa in laminas parvas sed normales, recurvatas vel ex suberecto apice deflexas producta. Inflorescentia e ramulis perabbreviatis, vix ultra 3-floris composita, ad 40 mm longa et 30 mm diam. metiens. *Brassicae* capiti haud dissimilis; axibus dense albido-tomentellis; bracteis primariis e foliorum descriptorum vaginis dilatatis formatis, dorso albo-tomentellis; bracteolis florigeris sepalis similibus sed majoribus (\pm 30 mm longis), pallidis, dorso tomentellis, margine serrulatis. Flores ut videtur bracteolas haud superantes ad 30 mm longi, brevissime pedicellati; sepalis pallidis, dorso adpresse albo-tomentellis, nullo modo reflexis, ad 20 mm longis. Petala coeruleo-rosea (ex cl. GLAZIOU!), vix aperta, sepala minute tantum superantia, lingulato-linearia, apice rotundata, carnosa, 5—6 mm a basi coalita. Stamina petalis bene breviora; antheris 8 mm longis, non nisi corosis cognitis. Ovarium anguste cylindricum basin versus paullo attenuatum subclavatum, perobtusè triangulare, albo-tomentosum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Goyaz, Campos do Rio Gama; GLAZIOU n. 22189. Floret Octobri, Novembri. (V. s. in herb. Berol., Mez.)

Obs. Cum sequentibus *Br. Serrae* Griseb. affinis, quam nunc speciebus his novis cognitis e *Karatas* subgenere ad *Eubromeliam* removendam censeo. Spinis omnibus

retro hamatis haec species et peraffinis sequens *Br. reversacanthae* quoque valde approximatur, quae tamen caule multo altiore, inflorescentia laxiore, ramis inflorescentiae perabbreviatis flores multo plures procreantibus, florum dimensione minore satis longe differt.

Bromelia Goyazensis Mez n. sp.; foliis super vaginam haud angustatis; inflorescentia contracte panniculata percompacte subcorymbosa, super foliorum rosulam haud vel vix elata; bracteolis florigeris quam ovaria multo longioribus sepala fere aequantibus, late ellipticis, apice rotundatis, concavis nec carinatis; petalis glabris; ovario tomento denso adpressoque brunneo-allutaceo oblecto.

Rosulae folia ignota. Scapus brevissimus nec e foliorum centro emergens, foliorum vaginis pallide roseis (ex cl. GLAZIOU!), late ellipticis, inflato-concavis, intus fere glabris dorso praesertim ad basin marginesque palaeaceo-tomentosis, prope apicem dentibus magnis patentibus spinulosis praeditis, in laminas magnas, usque ad apicem valide pungentem persensim angustatas, perrigidas, supra glabras subtus sub lente dense lepidotas, spinulis fere atris irregulariter et saepius internixte et apicem versus et retro hamatis, usque ad 3 mm longis armatas, summis ut videtur *Br. Serrae* ritu reflexas productis. Inflorescentia e ramulis perabbreviatis, paucifloris composita, capitato-subcorymbosa, ad 60 mm longa; axibus tomento denso palaeaceo, pallido oblectis; bracteolis florigeris pallidis, dorso minute tantum tomentellis, margine praesertim apicem versus minutissime serrulatis. Flores e bracteis emergentes, ad 45 mm longi, brevissime obscureque pedicellati; sepalis pallidis, apicem rotundatum irregulariterque crispatum versus saltem glabris, late ellipticis, paullo carinatis, \pm 30 mm longis. Petala coerulescentia (ex cl. GLAZIOU!), vix aperta, sepalis \pm 6 mm longiora, lingulato-linearia, apice rotundata, carnosa, medium usque coalita. Stamina petalis bene breviora, antheris linearibus, 7—8 mm longis, ut videtur apice obtusis, pro maxima parte cum stigmatibus ab insectis corrosis. Ovarium optime triangulare, sublineare, apice haud vel vix constrictum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Goyaz, ad Morro do Frota prope Meia Ponte, terrestri: GLAZIOU n. 22490. — Floret Augusto, Septembri. (V. s. in herb. Berol., Mez.)

Bromelia exigua Mez n. sp.; foliis super vaginam haud angustatis; inflorescentia percontracta capitiformi-globosa in foliorum centro nidulante sessilique; bracteolis florigeris sepala aequantibus, ex unguibus perlongis angustisque linearibus subito in laminas ellipticas dilatatis, apice rotundatis, concavis nec carinatis; petalis non nisi imperfectis cognitis glabris; ovario dense albo-tomentoso.

Rosulae folia basi in vaginas maximas, suborbiculares, crasse amylo repletas, dense rubricatas bulbum epigaeum perconspicuum formantes, prope apicem praesertim dorso squamis magnis palaeaceis brunnis oblectas ceterum glabras nitidasque subito dilatata, peranguste linearia, quam maxime recurva et longitudinaliter complicata, perrigida, apice pungentia, margine spinis infimis patentibus vel retro hamatis superioribus omnibus sursum inclinata, maximis utque ad 4 mm longis horrida, \pm 200 mm longa, medio ad 8 mm lata, adulta utrinque glabra. Scapus deest. Inflorescentia perabbreviata, subglobosa, pauciflora; bracteis primariis margine quam maxime patentiserratis, apicem versus praesertim dorso albo-tomentellis ceterum glabris, e basi linearis sursum sensum dilatatis, infimis in laminas parvas desinentibus superioribus apice pungentibus; bracteolis florigeris roseo-virentibus (ex cl. GLAZIOU!), dorso minute tantum tomentellis, margine

ad laminam dilatatam optime serrulatis. Flores albi (ex cl. GLAZIOU!) mihi non nisi imperfecti cogniti, ut videtur e bracteis vix emergentes, obscure pedicellati; sepalis pallidis, dorso dense albido-tomentellis, ad 12 mm longis, valde carinatis, explanatis ellipticis, apice rotundatis et cucullatis. Petala cum genitalibus inclusis non vidi. Ovarium stipitifforme sensimque in pedicellum obscurum transiens, vix angulatum, apice haud constrictum. Fructus ignotus.

Brasiliae prov. Goyaz, ad Capelinha da Sto. Antonio, campicola et terrestris: GLAZIOU n. 22492. — Floret Octobri. (V. s. in herb. Berol., Mez.)

Bromelia villosa Mez n. sp.; foliis super vaginam haud angustatis; inflorescentia percontracta capitato-corymbosa in foliorum centro nidulante sessilique; bracteolis florigeris sepala aequantibus, spathulato-linearibus, apice rotundatis, concavis nec carinatis, densissime cum floribus albo-villosis; petalis ut videtur quam sepala paullo tantum longioribus, vix non glabris; ovario densissime villosa.

Rosulae folia basi in vaginas maximas elongatasque subellipticas, arcte imbricatas bulbum epigaeum formantes, densissime inferne squamis maximis palaeaceis brunneis superne et dorso et intus villo crasso detergibili candido obtectas dilatata, persensim e basi in apicem validissime pungentem angustata, quam maxime recurvata, longitudinaliter complicata, perrigida, margine spinis flavis infimis patentibus sequentibus retro-, summis saltem optime sursum uncinatis horrida, \pm 150 mm longa, medio ad 20 mm lata, adulta quoque dense lepidibus parvis albidis obsecta cinerea. Scapus deest. Inflorescentia subpauciflora, perabbreviata; bracteis primariis i. e. cyathidii involucri a foliis rosulae haud diversis; bracteolis florigeris sicut flores villo e squamis palaeaceis contexto percrasso obtectis candidis, integerrimis vel non nisi apice paullo serrulatis. Flores albi (ex cl. GLAZIOU!), e bracteis emergentes, non nisi permanci et ab insectis corrosi cogniti, pedicellis e gracilioribus persensim in ovaria transeuntibus stipitati; sepalis pallidis, apice sicut petala et genitalia interiora constrictis tantum mihi ante oculos nec hoc in statu accuratius describendis. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Goyaz, inter Sitio do Baracão et Areias, campicola terrestrisque: GLAZIOU n. 22491. — Floret Septembri. (V. s. in herb. Berol., Mez.)

Canistrum ingratum Mez n. sp.; inflorescentia specie simplice basi tantum ramulos paucos brevissimos, glabros, apice flores subumbellatos gerentes procreante, glabra; bracteis primariis (cyathidii involucri) maximis, elongate triangularibus, suberectis nec recurvis, spinis maximis horridis; bracteolis florigeris angustissime linearibus, longe acutis; floribus (petalis neglectis) 65—70 mm longis; sepalis glabris, liberis; petalis ignotis.

Folia vagina ignota optime linearia, apice acuta et in mucronem horridum producta, margine spinis maximis, badiis, sursum spectantibus armata, metralia vel ultra, vix ultra 40 mm lata, lacte viridia, perrigida. Inflorescentia in scapi brevissimi percrassique, glabri apice vix non foliorum rosulae centro profunde immersa sessili-nidulans, foliolorum splendide rubrorum (ex cl. Magelhães), fere 0,2 m longorum, glabrorum, persensim in apicem horridum pungentem angustatorum, spinis usque ad 5 mm longis, patentibus, atris armatorum coma maxima cineta, (coma computata) \pm 0,3 m diam. metiens, ∞ -flora, glabra; bracteolis florigeris sepala aequantibus. Sepala ex sicco brunnea, rigidiuscula, glaberrima. \pm 38 mm longa, carinata, e basi sensim in apicem per-

acutum subpungentemque angustata conspicue asymmetrica. Petala lutea, cet. ignota. Ovarium glaberrimum, compressum, biangulatum, tubo epigyno nullo, ± 23 mm longum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Minas Geraës in Serra da Conceição (da Mantiqueira): de Magelhães in herb. Comm. Geogr. et Geol. de Minas n. 1585. — Floret Julio. (Herb. Berol.)

Canistrum Schwackeanum Mez n. sp.; inflorescentia specie simplici basi tantum ramulos perpaucos brevissimos, glabros, apice flores nonnullos subumbellatos gerentes procreante, glabra; bracteis primariis (cyathidii involucri) perconspicuis, erectis nec recurvis, inflorescentiam obtegentibus celantibusque, ex ovato triangularibus, spinis validiusculis armatis; bracteolis florigeris angustissime linearibus, longe acutis; floribus (petalis neglectis) 40 mm longis; sepalis glabris, liberis; petalis basin usque liberis sed alte cohaerentibus.

Folia basi in vaginam magnam, elongate ellipticam, lepidibus parvis adpressisque badiis punctulatam dilatata, super vaginam \pm angustata ensiformia, apice mucrone lato valide pungente imposito subrotundata, margine spinis patentibus, vix ultra 2 mm longis, badiis armata, semimetralia, 40 mm infra apicem ± 50 mm lata, lacte viride coriacea. Inflorescentia alba, cyathidio adeo obiecta ut non nisi dissecta appareatur, formicis inumeris repleta (ex cl. SCHWACKE!), in scapi elegantissimi tenuisque, fere 0,5 m longi, omnino aphylli, glabri apice elata, foliorum viridum apice atro-violaceorum (ex cl. SCHWACKE!), usque ad 0,4 m longorum, apice in spinam validam desinentium acutorumque, margine spinulis patentibus, usque ad 4 mm longis praeditorum coma intime cincta, ± 70 mm diam. metiens, subpauciflora, glabra; bracteolis florigeris quam sepala ± 7 mm brevioribus. Sepala pallide virentia vel alba, coriacea, glaberrima, ± 22 mm longa, prope basin minute tantum carinata, e basi in apicem filiformi-peracutum sensim angustata, paullo asymmetrica. Petala alba, e sepalis paullo tantum emergentia, infima basi ligulis binis parvis dorso cum petalis connatis, margine liberis, apice dentibus 4—2 magnis acutis praeditis aucta, cet. mihi ignota. Stamina omnino libera. Ovarium glabrum, triangulare, tubo epigyno nullo, ± 20 mm longum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Minas Geraës, prope Ouro-Preto locis umbrosis ad rivulos: SCHWACKE n. 10558. — Floret Julio. (Herb. Mez.)

Portea Silveirae Mez n. sp.; foliis margine spinis magnis praeditis; inflorescentia dense paniculata ramis inferioribus tantum bracteis amplis suffultis flores haud corymbosos gerentibus; rhachi ramulisque densissime lanuginosis; bracteolis florigeris minutis.

Folia basi in vaginas perconspicuas, ellipticas, utrinque lepidibus badiis, adpressis densissime punctulatas dilatata, margine spinis rectis inferioribus patentibus superioribus curvis spectantibus, badiis dense horrida, sensim in apicem acutum et spina validissima brunnea armatum angustata, imperfecta solum cognita certe metralia vel ultra, ± 60 mm lata. Scapus percrassus, ceterum ignotus. Inflorescentia ∞ -flora, tripinaxim amplissime paniculata, densiuscula, subcylindrica sed apicem versus sensim acuta, in specimine nostro 0,5 m longa, 0,4 m diametro metiens, ut videtur in vivo tota praeter florum sepala petalaeque indumento sordido, e lepidibus maximis furfuraceis formato densissime obiecta; bracteis primariis infimis late lanceolatis, in spinam pungentem desinentibus, integerrimis, ramulos axillares longe quidem superantibus sed

nullo modo obtegentibus; bracteis primariis superioribus valde diminutis anguste linearibus, his quoque ramulos axillares aequantibus; bracteolis florigeris minutis, filiformi-linearibus, quam florum pedicelli permulto brevioribus. Flores 40—45 mm longi, pedicellis gracilibus, \pm 40 mm longis stipitati; sepalis ad 9 mm connatis, a basi usque ad spinulam apicalem conspicuam recurvo-patentem 43 mm longis sed latere dextro in alam maximam, spinula terminali iterum 7 mm altiore dilatis. Petala rubra (ex collect.!) sepalis \pm 20 mm longiora ceterum ob conservationem accuratius non describenda. Ovarium clavatum, 40 mm longum.

Brasiliae civit. Minas Geraës, in Serra da Conceição (da Mantiqueira) arboribus epiphyta: SILVEIRA in herb. Comm. Geogr. et Geol. de Minas n. 8. — Floret Julio. (Herb. Berol.)

Obs. A peraffini simillimaque *P. Petropolitana* inflorescentia compactiore indumentoque primo intuitu differt.

Dyckia horridula Mez n. sp.; foliis margine conspicue aciculoso-spinosis; vaginis scapalibus quam internodia multo brevioribus, integerrimis vel serrulatis; inflorescentia peraxe subracemosa; bracteis e late ovato longe acutis, flores subaequantibus; floribus breviter nunc brevissime stipitatis; sepalis apice late acutiusculis; petalorum laminis stamina perlonge superantibus; filamentis ultra tubum petaleo-stamineum usque ad apicem tubulose connatis; stylis 3 brevissimis, capitulatum conglutinatis.

Florifera infra 0,4 m alta; rhizomate erecto brevi, percrasso, amylo repleto, foliorum delapsorum cicatricibus rudimentisque dense transverse striatim induto. Folia ad 0,13 m longa, subtus juniora sub lente lepidoto-puberula adultiora fere omnino glabrata, supra glabra, spinulis usque ad 2 mm longis, tenuissimis optime aciculiformibus, rectis, patentibus vel suberectis, brunnescentibus dense horridula. Scapus glaber, simplicissimus, vaginis ex anguste ovato sensim longe pungenterque acutis praeditus. Inflorescentia perpauci- (3—5-)flora, folia triplo vel ultra superans, glabra; bracteis subpatentibus, integerrimis. Flores suberecti, pedicellis primum brevissimis tunc paullo auctis usque ad 2,5 mm longis stipitati, vix ultra 7 mm longi, lutei (ex cl. GLAZIOU!); sepalis ovato-triangularibus, apice acutiusculis, \pm 6 mm longis. Petala sepalis paullo tantum (4 mm) longiora, nullo modo unguolata ita ut lamina distincta vix appareat, satis concava, elliptica, acutiuscula. Stamina petalis permulto (duplo v. paullo ultra) breviora; antheris brevissimis (1,75 mm) linearibus, apice subrotundatis, vix recurvis. Ovulorum ala lateralis maxima, vexilliformi-falcata.

Brasiliae civit. Goyaz, ad Rio Descoberto, prope Capelinha, terrestris campicola: GLAZIOU n. 22194. — Floret Octobri. (Herb. Berol., Mez.)

Obs. Species persingularis, ex habitu characteribusque generalibus certissime *Dyckia*, sed petalis exungulatis a generis formis reliquis mox distinguenda.

Dyckia eminens Mez n. sp.; foliis margine conspicue spinosis; vaginis scapalibus internodia superantibus vel summis aequantibus, super basin amplexicauli-dilatatis, margine valde serrulatis; inflorescentia simplicissima laxe racemosa; bracteis sepala aequantibus e late ovato inferioribus acuminatis superioribus acutis; sepalis apice late rotundatis; petalorum lamina perconspicua stamina longe superante; filamentis ultra tubum petaleo-stamineum liberis; stylo brevissimo.

Florifera metralis vel paullo ultra. Folia \pm 0,3 m longa, medio 20 mm lata, e basi in apicem horride pungentem sensim angustata, dorso tenuissime peradpressequ

lepidota, spinulis distantibus ± 4 mm longis, uncinatis, corneis armata. Scapus validus, in vivo lepidoto-furfuraceus siccus \pm glabratus, vaginis super basin paullo angustiores dilatatis hoc parte scapum involventibus tum in acumen longum apice pungens productis praeditis. Inflorescentia submultiflora, dense furfuracea; bracteis reflexis, dorso \pm furfuraceis, inferioribus ad 20 mm longis. Flores pedicellis perconspicuis sed infra 5 mm longis stipitati ± 44 mm longi, patentes vel patenti-reflexi; sepalis late ellipticis, ± 9 mm longis. Petalorum laminae suberectae, trapeziformes, carinatum complicatae, paullo undulatae. Antherae 3 mm longae, valde spiraliter revolutae. Ovulorum alae satis asymmetricae.

Brasiliae civit. Goyaz, loco non indicato: GLAZIOU n. 22192^a. (Herb. Mez.)

Lindmania Rusbyi Mez n. sp.; foliis basi spinulis paucis parvisque praeditis, apice perlonge filiformi-acutis nec pungentibus; vaginis scapalibus internodia perlonge superantibus, integerrimis; inflorescentia submultiflora, bi- vel tripinnatim panniculata, axibus glabris; floribus conspicue secunde versis; staminibus quam petala brevioribus.

Florifera semimetralis. Folia $\pm 0,2$ mm longa, ad 25 mm lata, linearia, apicem versus perlonge acuta et in acumen tenue longe filiforme desinentia, explanata vel decurvata, ut videtur dimorpha altera angustiora manifestius altera latiora obscure spinulosa, supra glabrata pallide viridia, subtus densissime lepidota alba, membranaceo-chartacea. Scapus gracilis, erectus, glaber, vaginis stricte erectis, omnibus in acumen perlongum optime filiforme desinentibus dense indutus. Inflorescentia laxa, $\pm 0,3$ m longa; ramis curvatim ascendentibus virgato-elongatis, tenuissimis, laxiuscule 8—15-floris; bracteolis florigeris late ovatis, acutis, minutissimis (supremis vix 4 mm longis), membranaceis. Flores bene nutantes, 3 mm longi; sepalis ovato-ellipticis, rotundatis, 4,5 mm longis. Petala sepalis duplo longiora, ut videtur virentia.

Boliviae prov. Jungas: RUSBY n. 2574. (V. s. a cl. Rusby communic.)

Obs. A peraffini *L. Weddelliana*, cui habitu bene congruit, imprimis foliis apice filiformibus nec pungentibus, floribus minoribus differt.

Hechtia myriantha Mez n. sp.; inflorescentia amplissima, densiuscule tripinnatim panniculata, ramulis elongatis cylindrice flores gerentibus; bracteolis sepala aequantibus vel his paullo tantum brevioribus; pedicellis brevibus, vix ultra 4,5 mm longis; sepalis (explanatis) apice rotundatis, ferrugineo-lepidotis mox glabrescentibus; petalis infime tantum minutissime connatis, apice optime rotundatis; ovario (in flore ♀ sterili) glabro.

Folia semimetralia vel ultra, sinuatum spinis maximis, corneis, sursum uncinatis horrida, adulta supra glabra subtus lineatum albida et prope basin in marginis sinibus barbis magna albis e lepidibus villosis formatis praedita. Scapus ignotus. Inflorescentia e fragmentis mihi cognitis certe metralis vel ultra, brunnescenti-furfuracea; bracteolis florigeris ± 5 mm longis, ex ovato optime acutis. Flores ♂ tantum cogniti ad 6 mm longi, sepala 3,5 mm longis, squamiformi-ovatis. Petala subelliptica, valde concava, albida. Stylus ex ovario in floribus ♂ rudimentariis absque dubio adest.

Mexico, ad Barranca de S. Maria Tlatella prope Mirador: LIEBMANN. (Herb. Haun.)

Hechtia Liebmannii Mez n. sp.; inflorescentia amplissima, laxe tripinnatim panniculata, ramulis elongatis, remote flores gerentibus; bracteolis mi-

nutis quam sepala permulto brevioribus; pedicellis conspicuis \pm 3 mm longis; sepalis apice acutiusculis; petalis omnino liberis, triangularibus, late acutis; ovario glabro.

Folia cum scapo ignota. Inflorescentia absque dubio maxima (plurimetralis), glabra; axi 20 mm diam. metiente, in bractearum primariarum axillis ramulos semper complures (sucto 3) collaterales, crassos, \pm complanatos, dissite flores gerentes, vix ultra 80 mm longos procreante, bracteolis florigeris pedicellos aequantibus, pellucido-membranaceis, anguste triangularibus. Flores ♀ tantum cogniti \pm 7 mm longi; sepalis 2,5 mm metientibus, quam petala stricte erecta subduplo brevioribus. Androecei exstant rudimenta filiformia. Ovarium maximum (petala longe superans), pyramidatum, stigmatibus 3 sessilibus.

Mexico, in rupibus prope Chinantla, dept. Puebla: LIEBMANN. — Floret Julio. (Herb. Haun.)

Vriesea modesta Mez n. sp.; foliis apice acutis et manifeste subpungenti-mucronatis, haud pictis, ensiformibus; scapo stricte erecto vaginis internodia superantibus; inflorescentia simplicissima laxiuscule pinnatimque disticha pauciflora, folia aequante; bracteis optime carinatis, valde incurvis, luteis apicem versus rubentibus, haud punctulatis, inferioribus saltem quam sepala manifeste brevioribus; floribus stricte erectis; sepalis latis, explanatis apice rotundatis; ovulis cornutis.

Florifera ad 0,3 m vel paullo ultra alta. Folia e vagina ut videtur pallide violascente absque dubio lacte viridia, \pm 0,3 m longa, 25 mm lata, super vaginam longe manifesteque angustata, glabriuscula. Scapus vaginis late ellipticis, ut videtur satis inflatis dense involutus. Inflorescentia \pm 120 mm longa, 30 mm lata, circuitu breviter linearis vel lanceolata rhachi valde geniculata a bracteis haud obiecta insignis; bracteis explanatis late ellipticis, acutis, a latere visis praesertim summis valde uncinatim incurvis, \pm 40 mm longis, 12 mm latis. Flores pedicellis brevibus quidem sed conspicuis crassis stipitati; sepalis \pm 34 mm longis. Petala cum genitalibus fructuque ignota.

Brasiliae civit. Minas Geraës, in Serra da Mantiqueira arboribus epiphyta: de Magalhaës n. 1020. — Floret Aprili. (Herb. Berol.)

Obs. Species optima, *Vr. psittacinae* ob inflorescentiam laxam comparanda, tamen speciebus inflorescentia flabellata praeditis, praesertim *Vr. incurvae* proxime accedit.

Vriesea Mülleri Mez n. sp.; foliis apice subrotundatis, haud maculatis, linearibus; vaginis scapalibus internodia longe superantibus; inflorescentia optime panniculata; bracteis ovato-ovalibus, optime distichis nec secunde versis, remotis nec per anthesin sibi incumbentibus, rubris, sepala subaequantibus, apicem rectum versus paullo carinatis; floribus suberectis; sepalis explanatis anguste ellipticis, acutis; petalis lingulatis, biligulatis; ovulis caudatis.

Florifera ad 0,7 m alta. Folia \pm 0,3 m longa, 30 mm lata, viridia basin versus vinoso-rubentia, glabra. Scapus validus, erectus, vaginis elliptico-triangularibus dense indutus. Inflorescentia submultiflora, ramulis erectis vel suberectis, brevibus (\pm 0,13 m), optime pinnatis; bracteolis brevissime lateque acutis, ad 35 mm longis. Flores \pm 45 mm longi, breviter sed manifeste crasseque pedicellati, sepalis ad 30 mm longis, haud carinatis. Petala cum genitalibus imperfecte cognita, ut videtur stamina superantia?

Brasiliae civit. Sta. Catharina, prope Blumenau: F. MÜLLER. (Herb. Mez.)

Obs. Habitus hybridae *V. Philippo-Coburgi* cum specie quadam dubia, fortasse *Vr. glutinosa*?

Tillandsia Seleriana Mez n. sp.; foliis basi bulbum percrassum efformantibus, utrinque densissime lepidibus magnis, palaceis obtectis recurvis, nec spiraliter tortis; inflorescentia subdigitaliter e spicis 5—7 aequalibus, flabellatis, ad 6-floris composita; bracteis florigeris paullo imbricatis axes non nisi imperfecte obtegentibus, foliorum ritu densissime lepidibus maximis pruinosis, sepala superantibus vel summis aequantibus, coriaceis; floribus erectis; sepalis antico cum reliquis brevissime, posticis binis inter sese ad 5—6 mm connatis; petalis tubulose erectis, quam stamina brevioribus; stylo perlongo.

Epiphyta, acaulis, florifera $\pm 0,25$ —0,3 m alta. Folia multa densissime rosulata basi in vaginas maximas, latissime ellipticas, dense bulbiformi-imbricatas, utrinque sed praesertim dorso densissime lepidotas, haud pictas dilatata, stipitiformi-convoluta sicca saltem fere teretia, usque ad 0,25 m longa inflorescentiam subaequantia vel paullo breviora, apice tenuissima nec filiformia, sicca brunnescenti-incana nigrantiaque, perrigida. Scapus brevis, erectus, omnino vaginis iis foliorum rosulae similibus et in laminas normales desinentibus obtectus celatusque. Inflorescentia spicis ad 40 mm longis, vix ultra 10 mm latis, lanceolatis bene compressis; bracteis primariis omnino vaginis scapalibus isomorphis inferioribus in laminas parvas normales spicas axillares aequantes vel paullo superantes productis superioribus quam spicae axillares brevioribus, omnibus membranaceo-coriaceis, densissime et pruinose lepidotis; bracteolis florigeris erectis, ± 9 mm distantibus margine membranaceis, basi paullo impressis, acute connatis, summis leviter uncinatum incurvis, acutis, ± 20 mm longis 10 mm latis. Flores brevissime pedicellati fere sessiles appellandi, genitalibus ignotis ad 35 mm longi; sepalis coriaceis, dorso glabris nitidisque et prominenti-venosis, apice rotundatis. Petala sepalis 15 mm longiora. Ovarium graciliter pyramidatum, in stylum tenue perlongum transiens. Fructus ignotus.

Patria ignota, aut Mexico aut Guatemala: CAEC. et ED. SELER n. 3439. (Herb. Berol.)

Obs. Et habitu et characteribus peraffinis *T. pruinosa*, cujus formam perluxuriantem aestimarem, nisi inflorescentia percomposita magis ad *T. streptophyllum*, *T. variegatum* etc. approximetur.

Tillandsia Rothschildiana Mez n. sp.; foliis dense utriculatis rosulatis, utrinque sed praesertim subtus lepidibus minutis, crebris, adpressis, albidis conspersis, apice acutis; scapo erecto, vaginis internodia permansu superantibus induto; inflorescentia bipinnatim disticheque pauciculata, axibus glabris; spicis omnibus subsessilibus, stricte erectis, flabellatis, ± 10 -floris; bracteolis florigeris sepala paullo sed constanter superantibus; floribus erectis; sepalis liberis, asymmetricis.

Epiphyta (ex cl. RORSENHUT!), acaulis, florifera fere semimetralis. Folio basi in vaginam maximam, interioribus late ellipticam, utrinque densissime lepidibus minutis adpressisque brunneis ipsam bruceam margine praesertim prope apicem membrana castanea pellucida cinctam dilatata, $\pm 0,25$ m longa, medio 20 mm lata, lingulata, apicem sensim acutum utque stricta, ex sicco superne maculis paucis triste coloratis ornata, chartacea. Scapus validus, glaber, folia paullo superans, vaginis stricte erectis

adpressisquē, dorso sicut folia lepidotis, apice haud laminigeris involutus. Inflorescentia submultiflora, densa, folia subduplo superans; rhachii paullo undulata; spicis rectis, strictissime erectis, e bracteis primariis magnis, ovatis, item stricte erectis, rigidis, mediis superioribusque saltem dorso glabris emergentibus, usque ad 45 mm longis, floriferis 9 mm latis, circuito lanceolatis, glabris; bracteolis florigeris densissime imbricatis sibi incumbentibus, rigidiusculis, glabris, laevibus, opacis, valde concavis nec carinatis, apice obtusis, ± 7 mm longis. Flores luteo-rubentes (ex cl. ROTSCHUH!), sessiles; sepalis rigidiusculis, glabris laevissimisque, ± 6 mm longis, apice late rotundatis, latere dextro in alam parvam dilatatis. Petala cum genitalibus mihi ignota.

Nicaragua, in collibus prope Jimotega, silvae humilis arboribus caesis epiphyta: ROTSCHUH n. 54. — »Torito« incolis. — Floret Februario. (Herb. Berol.)

Tillandsia Palmiana Mez n. sp.; foliis dense utriculatum rosulatis, utrinque lepidibus minutis, adpressis, albidis crebris conspersis, apice rotundatis; scapo erecto, vaginis internodia exacte aequantibus vel inferioribus paullo superantibus praedito; inflorescentia bipinnatim panniculata, axibus glabris; spicis omnibus subsessilibus, suberectis, flabellatis, usque ad 14-floris; bracteolis florigeris sepala paullo sed constanter superantibus; floribus erectis; sepalis liberis, asymmetricis.

Epiphyta, acaulis, florifera usque ad 0,6 m alta. Folia ± 45 , basi in vaginam maximam, latissime ovato-ovalem exterioribus fere orbicularem, utrinque densissime lepidibus minutis adpressisque umbrinis obtectam ipsam umbrinam, margine prope apicem membrana subatra pellucida cinctam dilatata, ± 180 mm longa, medio 25 mm lata, lingulata, apice anguste rotundata acumineque imposito reflexo-crispato aucta, ex sicco hinc inde maculis triste coloratis dissitis ornata, sicca quoque plana nec involuta, coriacea. Scapus gracilis, glaber, folia duplo vel ultra superans, vaginis paullo inflatis, dorso lepidibus pallidis peradpressisque cinereis, apice haud vel vix laminigeris involutus. Inflorescentia multiflora, perlaxa, folia perlonge superans; axibus omnibus rectis; spicis haud curvatis, usque ad 60 mm longis, in statu florifero 7 mm latis, circuito anguste linearibus, glabris; bracteis primariis suberectis, dorso lepidotis, quam spicae axillares permulto brevioribus; bracteolis florigeris imbricatis sibi incumbentibus, coriaceis, dorso juvenilibus paullo lepidotis celerime glabris, laevibus, valde concavis nec carinatis, explanatis latissime ovatis, apice obtusiusculis, ± 8 mm longis, explanatis 5 mm latis. Flores sessiles; sepalis coriaceo-rigidis, dorso glabris laevissimisque, 6—7 mm longis, ellipticis, apice late rotundatis, latere dextro in alam magnam productis. Petala ignota. Ovarium ellipsoideum, apice subito in stylum crassiusculum, duplo breviorum contractum. Capsula matura usque ad 48 mm longa, prismatica, acuta, basin usque dehiscens; seminibus coma nivea appendiculatis.

Costarica, prope la Palma, alt. 4500—4700 m, arboribus epiphyta: TOXBUTZ in herb. inst. phys.-geogr. Costaric. n. 9740. — Floret fructificatque Julio. (Herb. Bruxell.)

Tillandsia Tonduziana Mez n. sp.; foliis densissime rosulatis bulbum magnum efformantibus laminis stipitiforini-involutis, dense adpressequē lepidotis incanis; scapo erecto, vaginis internodia superantibus induto; inflorescentia subpauciflora, bipinnatim panniculata; spicis ± 6 -floris, glabriusculis, pinnatis, optime distichis nec secunde florigeris; bracteolis florigeris nec imbricatis nec axes obtegentibus, dorso lepidotis, quam flores multo brevioribus; floribus suberectis; sepalis liberis, asymmetricis.

Epiphyta, acaulis, florifera ad 0,25 m alta. Folia permulta basi in vaginam maximam, latissime elliptico-ovatum, valde concavam, utrinque densissime lepidibus minutis peradpressisque badiis conspersam ipsam badiam dilatata, \pm 130 mm longa, super vaginam ad 15 mm lata, persensim in apicem tenuiter stipitiformem angustata, tota longitudine marginibus involuta ipsa fistuloso-stipitiformia, coriacea, irregulariter tortuosa, omnia apice uncinatim recurvata. Scapus tenuis, cinereo-lepidotis demum glabratus, vaginis tubulose convolutis paullo tantum inflatis, in laminas breves nunc spiraliter nunc uncinatim recurvas desinentibus, dense adpresseque cinereo-lepidotis omnino obtectus. Inflorescentia folia subduplo superans, axibus adpresse cinereo-lepidotis demum glabratis; rhachii quam maxime geniculata; spicis omnibus distiche e rhachii provenienti, brevissime stipitatis, refractis; bracteis primariis late ovato-lanceolatis, valde concavis, inferioribus mediisque ramulos axillares aequantibus vel paullo superantibus; bracteolis florigeris latissime ovatis, subacutis, patentibus, vix ultra 3 mm longis. Flores sessiles; sepalis subobovatis, apice valde obtusis et latere dextro in alam magnam rotundatam productis, coriaceis, 4—5 mm longis. Capsula 15 mm longa, cylindrico-prismatica, valvis dorso allutaceis vix rugosis, intus subatris; seminum coma nivea.

Costarica, prope la Palma, alt. 1500—1700 m, arboribus epiphyta: Tondez in Herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 9708. — Floret fructificatque Julio. (V. s. in herb. Bruxell.)

Obs. Species habitu *T. Schumannianae* e Columbia allatae similis, cui tamen differt scapo altiore, inflorescentia haud ferrugineo-lepidota etc. — In systemate meo inter *T. adpressam* et *T. Jenmani* inserenda.

Tillandsia Augustae regiae Mez n. sp.; statura minore; foliis rosulatis, glabriusculis; inflorescentia laxiuscule bipinnatim panniculata; spicis 2 (—3)-floris, optime pinnatis, inferioribus patentibus omnibus quam bractee primariae brevioribus vel summis ea aequantibus; bracteolis florigeris quam sepala brevioribus, obtuse carinatis; sepalis subaequaliter liberis.

Acaulis, florifera ad 0,35 m alta. Folia pulcherrima, in viridi elegantissime rubropicta et 20 dense subtriculatimque rosulata, basi in vaginam magnam, ovato-ovalem dilatata, lingulato-linearia, apicem subacutum versus breviter angustata, \pm 0,18 m longa, medio ad 28 mm lata, ut videtur vix rigida. Scapus validus, erectus, vaginis multis omnino foliaceis erectis vel superioribus suberectis, internodia optime superantibus dense involuta, glaber, folia subaequans. Inflorescentia quam in affinibus speciebus multo latior nullo modo cylindrica dicenda, \pm 0,45 m longa, (bracteis computatis) ad 80 mm diam. metiens; bracteis primariis amplissimis, inferioribus mediisque breviter foliaceis summis e latissime ovato triangulo-acutiusculis, satis concavis, propter situm patentem vel superiorum subpatentem nullo modo imbricatis; spicis omnibus manifeste stipitatis, axi ultra florem ultimum semper longe producto bracteis nonnullas steriles procreante; bracteolis florigeris glabris, laevibus, satis navicularibus, nec imbricatis nec axes obtegentibus, 1 12 mm longis, apice rotundatis. Flores plane sessiles, suberecti, non nisi fructiferi cogniti; sepalis dorso glabris, laevissimis, ad 15 mm longis, ellipticis, apice late truncato-rotundatis minuteque asymmetrice emarginatis. Petala cum genitalibus ignota. Capsula perlonga (30 mm), cylindrico-prismatica, apice acutiuscula nec rostrata, laevis.

Columbia, in Quindiu montibus, reg. temp. (2000—3000 m): Serenissima princepsfemina THERESA BAJUVARIAE. (V. in spirit. vini conserv.)

Obs. Species pulcherrima distinctissimaque, ex affinitate *T. ionochromae*, *T. biflorae* notum serenissimae inventricis in honorem matris denominata.

Tillandsia goyazensis Mez n. sp.; statura minore; foliis haud bulbosiusculatis, dense lepidibus cinereo-albidis maximis oblectis insigniter pruinose micantibus; inflorescentia subdigitatim disticheque bipinnatim panniculata; spicis densissime dispositis, flabellatis, 6—7-floris, bracteas primarias perlonge superantibus; bracteolis florigeris dorso valde prominenti-venosis, glabris vel minute tantum lepidotis; floribus erectis; sepalis posticis binis ad 3 mm altius quam cum antico inter sese connatis; petalis stamina superantibus.

Acaulis, florifera infra 0,3 m alta. Folia ± 20 dense fasciculatim rosulata, basi in vaginam inconspicuam et a lamina aegre discernendam, infime glabram superne praesertim dorso lepidotam producta, usque ad 220 mm longa, 17 mm lata, fere e basi perlonge in apicem filiformi-acutum angustata, rigida, tota longitudinaliter involuta vel complicata apicem versus subulata. Scapus validiusculus, erectus, foliis paullo brevior, dense vaginis apice stipitiformi-acutis, dorso micanter sicut folia lepidotis, stricte erectis internodiisque superantibus involutus. Inflorescentia submultiflora, folia paullo sed ut videtur constanter superans, ± 80 mm longa; bracteis primariis lingulatis, dorso sicut scapi vaginae lepidotis, optime distichis, stricte erectis; spicis subsessilibus, valde sibi approximatis, pulcherrime rubris, rhachi taliter insertis ut facies duo applanatae coelum terramque versus spectent (spicarum acies horizontales nec verticales!), basi bracteis 2—3 sterilibus acutis, convexiusculis, circuito lanceolatis, ± 50 mm longis, 8 mm latis, apice sensim auctis, ex stricte erecto nonnunquam fere insensim decurvis; bracteolis florigeris erectis, dense imbricatim sibi innubentibus, chartaceis, hyalino-marginatis, breviter acutis sueto minute mucronulatis, ± 80 mm longis, sepala optime superantibus. Flores fere sessiles, ± 20 mm longi; sepalis chartaceis, dorso glabris laevibusque, explanatis ovato-lanceolatis, apice breviter acutis minutissimeque mucronulatis, ± 17 mm longis. Petala sepalis ad 3 mm longiora, ex sicco alba, laminis anguste ellipticis, apice rotundatis, per anthesin erectis. Stamina antheris 4—5 mm longis, linearibus, prope basin dorsifixis. Ovarium prismatico-pyramidatum, in stylum perlongum gracilemque transiens. Fructus ignotus.

Brasiliae prov. Goyaz: GLAZIOU n. 22196. (Herb. Mez.)

Obs. Species ex intima affinitate Argentinensium quærendam nempe *T. Lorentzianae*, *T. vernicosae*, *T. didistichae*. Habitu imprimis *T. vernicosae*, characteribus *T. Lorentzianae* accedit, ab utraque tamen momentis haud levibus satis distincta.

Tillandsia linearis Vell. (Flor. Flumin. III. t. 428; Mez in Flor. Brasil. p. 608 et Monogr. p. 860). — E specimine a cl. GLAZIOU sub n. 22197 transmisso florifero identitas cum *T. Selloae* C. Koch (Ind. sem. hort. Berol. 1873, Mez Monogr. p. 672) adhuc absque petalis tantum cognita plane elucet. Descriptioni speciei adde: Petala (vix non coerulea) laminis explanatis, maximis (10 mm longis et fere aequilatis), suborbiculari-rhomboides. — *T. Selloae* nomen ex prioritatis legibus delendum. (Herb. Mez.)

II. Lauraceae.

Cryptocarya minutiflora Mez n. sp.; ramuli glaberrimi cortice aromatico. Folia sparsa, rigida, glaberrima, subtus glaucescentia, lanceolata, basi acuta apice acuminata, supra fere laevia subtus densissime prominuloreticulata. Inflorescentia (non nisi juvenilis descriptioni adest) pauciflora,

ferrugineo-subsericea. Flores subsericei, vix ultra 1 mm longi. Perianthii tubus brevis; lobi tubo longiores (num in statu juvenili tantum?), ovati, acuti, androeceum superantes. Filamenta perianthio adnata. Antherae ovatae, apicem versus angustatae, connectivo vix producto apice truncatae. Glandulae sessiles. Stylus ovarium subaequans.

Arbor vel frutex ramulis teretibus, castaneis, gemmis ferrugineo-subsericeis. Folia petiolis usque ad 6 mm longis, profunde canaliculatis praedita, \pm 60 mm longa, 20 mm lata, penninervia, costis e nervo medio sub angulo 50—60° prodeuntibus, margine fere plano. Inflorescentia axillaris, paupere paniculata subracemosae speciem praebens, erecta, foliis permulto brevior, pedicellis brevissimis. Androeceum filamentis parce pilosis; glandulis parvis; staminodiis ser. IV. sagittiformibus, subsessilibus, apice barbatis. Ovarium glabrum, lageniforme, stigmatibus obtusis. Fructus ignotus.

Brasilia: loco non indicato: GLAZIOU n. 48437 (herb. Berol.).

Boldus costaricensis O. Ktze. (Revis. II. p. 569). Diagnosi in Monogr. Laurac. p. 27 datae adde fructus descriptionem:

Bacca optime ellipsoidea, apice styli rudimentis minutissime mucronulata, \pm 15 mm longa, 6 mm diam. metiens, cupulae satis incrassatae sensimque in pedicellum transeuntis, margine perianthii lobis persistentibus optime 6-dentatae insidens, fere omnino exserta.

Costarica: ad Rio Segundo ripas altit. 2000 m: Tonduz in herb. inst. phys.-geogr. Costaric. n. 4794. (Herb. BRUXELL.)

Ajouea Schwackeana Mez n. sp.; ramuli glabri. Folia coriacea, glaberrima, elliptico-lanceolata, basi acuta apice breviter sed manifeste acuminata, penninervia, utrinque prominulo-reticulata, margine non incrassato. Inflorescentia glabra, laxe paupereque panniculata, foliis brevior. Flores glabri, 2 mm longi. Perianthii tubus conspicuus, lobi subrotundati. Androeceum sericeus 3 exterioribus fertilibus, quarta tantum staminodiali. Antherae locellis magnis, elongatis connectivo paullo tantum producto apice acutiusculae. Staminodia ser. IV. longe stipitata. Stylus ovario paullo brevior.

Arbustula (ex cl. SCHWACKE!) ramulis gracillimis, glabris, haud glaucescentibus adultis brunneis, teretibus, gemmis ochraceo-subsericeis, cortice esipido. Folia petiolis ad 10 mm longis, canaliculatis stipitata, sparsa, \pm 65 mm longa, 35 mm lata, supra obsolete sub prominenti-reticulata, costis binis infimis suberectis et folio subtriplynerviis speciem praebentibus, superioribus subpatentibus. Inflorescentia haud glaucescens pedicellis ad 8 mm longis gracillimis, bracteolis celerime deciduis. Flores minime glauci, vivi virides (ex cl. SCHWACKE!), 2 mm longi; perianthii tubo magno, apice bene constricto, acuminatim in pedicellum transeunte. Limbi segmenta genitalibus satis longiora, aequata. Filamenta antheras subaequantia, margine pilosa, ser. III. basi glandulis binae exacte globosis, flavido-viridibus auctis. Antherae ser. I., II. bene introsum, ser. III. extrorsum delinquentes; ser. exteriorum ovatae, apicem versus sensim attenuatae. Staminodia ser. IV. magna, stipulis longis valde pilosis elata. Ovarium glaberrimum ovoidem; stylo crassamento tereti, stigmatibus obtusis. Fructus ignotus.

Brasilia: civit. Minas Geraës, in Serra da Jacuba: SCHWACKE n. 8742. (Herb. Berol., Mez.)

Obs. Peraffinis adest planta a cl. SCHWACKE n. 8836 (= GLAZIOU n. 20441) inter Oyo Preto et Cachoeira do Campo collecta apud GLAZIOU monstruosa tantum edita, quam

e floribus perjuvenilibus mihi traditis *Ajoucae Severini* congenerem aestimandam puto. Differt tamen a typo SEVERIN n. 439 inflorescentia viridi nec glauca, habitu. An haec quoque nova species, *A. Severini* et *Schwackeanae* intime affinis?

***Ajouea marginata* Mez n. sp.;** ramuli novelli pilis longissimis, ochraceo-ferrugineis pubescentes. Folia coriaceo-rigida, adulta glabra, latissime elliptica, utrinque breviter nunc brevissime acuminata, optime trinervia, utrinque prominulo-reticulata, margine quam maxime incrassata. Inflorescentia glabra, paullo glaucescens, folia bene superans. Flores glabri, 2—2,5 mm longi, perianthii tubo lobos quam genitalia vix longiores subaequante. Androeceum seriebus 2 exterioribus fertilibus, 2 interioribus staminodialibus. Antherae filamentis paullo longiores, introrsae, connectivo haud vel vix producto apice acutae. Staminodia ser. IV. sessilia. Stylus ovario paullo longior.

Arbor vel frutex ramulis celerrime glabratibus badiis vel castaneis, teretibus, gemmis tomentosis, cortice esipido. Folia petiolis usque ad 40 mm longis (e maximis totius familiae), levissime tantum canaliculatis basin versus omnino teretibus, sparsa, rigida, novella longe flavido-pilosa sed celerrime glabrata, sicca laete vel flavescenti-viridia subtus juniora paullo glaucescentia adulta concolora, \pm 120 mm longa, 70 mm lata. Inflorescentia permultiflora, amplissima, elongata, pedicellis 2—5 mm longis, bracteolis diu persistentibus. Flores perianthii tubo conico, apice haud constricto basi sensim in pedicellum attenuato; limbi segmentis latissime ellipticis, apice triangulo-acutiusculis. Staminodia ser. III. liguliformia, basi glandulis binis parvis praedita; ser. IV. perlonge acuminatimque acuta. Ovarium glaberrimum, subglobosum stigmatibus obtuso.

Brasiliae civit. Goyaz: GLAZIOU n. 22050. (V. s. in herb. Berol., Mez.)

Obs. Species pulcherrima, notis permultis *Ajoucae ellipticae* accedens, tamen distinctissima, foliorum margine quam maxime incrassato jam sterilis perinsignis.

***Ajouea farinosa* Mez n. sp.;** ramuli novelli dense ochraceo- vel flavido-tomentosi. Folia coriaceo-rigida, adulta perfecte glabrata, elliptico-lanceolata, basi breviter acuta apice brevissime et saepius obscure acuminata, penninervia, utrinque praeter costas subtus paullo prominulas laevia, margine vix incrassata. Inflorescentia pilis longis \pm dissitis insignis et insuper valde albo-pruinosa, foliis brevior. Perianthii tubus lobos quam genitalia vix longiores subaequans. Androeceum seriebus 2 exterioribus fertilibus, 2 interioribus staminodialibus. Antherae filamentis paullo breviores, introrsae, connectivo paullo producto apice acuminatae. Staminodia ser. IV. brevissime stipitata. Stylus ovario fere duplo longior.

Arbor vel frutex ramulis mox glabratibus castaneis, subteretibus, gemmis dense flavido-tomentosis, cortice esipido. Folia petiolis usque ad 15 mm longis, levissime canaliculatis, basin versus incrassatis, sparsa, novella utrinque pilosa adultiora praeter petiolo laminaeque basin pilosam glabrata mox omnino pilis destituta, opaca, sicca laete viridia, \pm 120 mm longa, 45 mm lata, costis non nisi filiformi-prominulis adscendentibus. Inflorescentia multiflora, ample panniculata, pedicellis 3—6 mm longis, bracteolis diu persistentibus. Flores manifeste sparse pilosi, 3 mm longi; perianthii tubo apice haud constricto, late conico, subito in pedicellum contracto; limbi segmentis ovatis, late triangulo-acutis. Filamenta manifeste sed breviter pilosa. Staminodia ser. III.

maxima, crasse ligniformia; ser. IV. magna, subfoliolacea, apice longe acuta. Ovarium globosum in stylum subduplo longiorem contractum, stigmatibus obtusis.

Brasiliae civit. Goyaz: GLAZIOU n. 22054. (V. s. a. cl. GLAZIOU mecum benigne communic.)

Obs. Inflorescentia (item sparse pilosa) maxima foliaque longe superante differt Glaziovii n. 22053, attamen differentiae analyticae desunt et axes novelli indumento congruo oblecti. Sed inflorescentia haud pruinosa et habitu recedit. Num nova sit species vel proximae *A. farinosae* adnumeranda, difficillimum est dijudicatu.

Endlicheria Lhotzkyi Mez (Berl. Jahrb. V. 122); adsunt e diversis collectionibus et flores masculini et fructus, adhuc ignoti. Adde descriptioni: Inflorescentia ♂ multiflora, ex amplioribus, folia subaequans vel iis paullo brevior; flores parvi (vix 2 mm), perianthii tubo quam in floribus ♀ minore; filamentis quam antherae paullo longioribus, latere longe paraeque pilosis, ser. III. prope basin glandulis binis subglobosis, perconspicuis, subsessilibus auctis; antheris vix longioribus ac latis, e basi ovata sensim apicem versus angustatis demum rotundatis; staminodiis nullis; ovario valde reducto, stipitiformi. Bacca parva (\pm 40 mm longa), ovoidea, apice acutiuscula, pedicello turbinatim incrassato, perianthii subpersistentis lobulis coronato insidens.

Brasiliae civit. Mato Grosso, prope S. Cruz da Barra do Rio dos Bugres: LINDMAN in herb. Regnell. A, 3153 et loco non indicato: SPENCER MOORE 518 (herb. Berol., Mez.).

Persea fusca Mez n. sp.; folia petiolata, juniora utrinque dense ferrugineo-velutina adulta supra omnino glabrata, elliptica vel ovato-elliptica, basi rotundata, apice brevissime obtuseque acuminata. Inflorescentia multiflora, dense ferrugineo-velutina, thyrsoideo-paniculata, folia optime superans. Limbi segmenta exteriora interioribus subduplo breviora. Androeceum seriebus 3 fertilibus; filamentis longe pilosis quam antherae $4\frac{1}{2}$ -plo longioribus; glandulis sessilibus, basi filamentis ser. III. adnatis; antheris omnibus 4-locellatis, ser. exterior. apice late obtusis emarginatisque. Ovarium dense longeque pilosum, stylo $4\frac{1}{2}$ -plo longiore.

Arbor vel frutex ramulis pervalidis, apice dense ferrugineo-tomentosis, sero glabrescentibus subatris, brevitibus, gemmis tomentosis, cortice esipido valde mucoso. Folia petiolis usque ad 8 mm longis, tomentosis, non nisi levissime canaliculatis praedita, sparsa, perrigida, adulta supra glabrata nitida et praesertim secus nervos primarios *P. punctatae* ritu minute punctato-foveolata, \pm 90 mm longa, 60 mm lata, supra fere laevia subtus prominenti-costata obscuriusque laxe reticulata, costis e nervo medio sub angulo 40—60° prodeuntibus, margine incurvo. Inflorescentia pedicellis 4—4 mm longis, bracteola cito decidua. Flores 6—7 mm longi, dense ferrugineo-villosi; limbi segmenta exterioribus latissime ovato-ellipticis apice subcucullatis, interioribus elliptico-lanceolatis apice acutiusculis et intus apicem versus longe ferrugineo-pilosis. Antherae ser. III. lateraliter dehiscentes. Staminodia maxima, sagittata, dorso laevia apice et anteriore latere longe hirsuta, breviter stipitata. Ovarium ovoideum, stigmatibus maxime deoformi. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Goyaz, loco non indicato leg. GLAZIOU n. 22068. (V. s. in herb. Berol. et a cl. GLAZIOU mecum benigne communic.)

Var. **angustifolia** n. var.; a typo differt foliis satis angustioribus, elliptico-lanceolatis, basi acutiusculis apice manifestius acuminatis, foliis adultis subtus quoque fere omnino glabratiss, floribus minoribus. — Ad *Perseam punctatam* transitum parat.

Brasiliae civit. Goyaz: GLAZIOU n. 22 069.

Obs. Typus habitu maxime ad *P. pedunculatam* (cujus specimen a cl. SCHWACKE in monte Itacolomy sub n. 40249 collectum mihi adest), varietas ad *P. punctatam* tendit, sed *P. lanceolatae* quoque (GLAZIOU n. 22 070^a) similis videtur.

Persea Pittieri Mez n. sp.; folia perlonge petiolata, adulta quoque supra praesertim ad costas peradpresse ferrugineo-tomentella demum \pm glabrescentia haud vel vix foveolata, subtus breviter tomentella, obovata. Inflorescentia subpauciflora, adpresse ferrugineo-tomentosa, foliis brevior. Flores limbi segmentis solemmniter aequilongis; androeceo seriebus 3 fertilibus; filamentis quam antherae omnes 4-locellatae manifeste longioribus; ovario dense tomentello.

Arbor vel frutex ramulis crassis, novellis densissime ferrugineo-tomentosis, cortice mucoso. Folia petiolis usque ad 65 mm longis, supra haud vel vix canaliculatis, dense ferrugineo-tomentosis stipitata, ad ramulorum apicem collata, subcoriacea, supra tomento brevissimo puberulo ad nervum medium costasque persistente ceterum \pm detricto, subtus tomento densiore peradpressoque, ad nervos subferrugineo ceterum cinereo oblecta, utrinque optime rotundata vel basi minutissime obscureque cordata apice acuminulo latissimo brevissimoque, obtusiusculo imposito aucta, \pm 170 mm longa, 445 mm lata, penninervia, supra sublaevia subtus reti denso prominulo ornata. Inflorescentia perdense tomentosa, satis longe stipitata, perlaxa; pedicellis maximis (10—20 mm longis), optime patentibus, sueto binis vel ternis ex axi communi fasciculatim prodeuntibus; bracteolis deciduis. Flores ad 9 mm longi, adpresse ferrugineo-tomentelli; perianthii tubo subnullo; lobis lineari-lanceolatis, longe acutis; filamentis ser. III. glandulis binis subreniformibus, stipitibus manifestis pilosis elatis auctis; antheris angustis sublinearibus, apice rotundatis, ser. III. lateraliter dehiscentibus; staminodiis ser. IV. subsagittatis, stipitibus crassiusculis paulo longioribus, dense pilosis elatis, apice haud barbatis. Ovarium dense breviterque cinereo-tomentellum. Fructus ignotus.

Costarica: in valle de Rancho Redundo, ad vulcanum Irazu, alt. 1300 m: Pittier in herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 1156. Floret Aprili (herb. Bruxell.).

Phoebe tetragona Mez (Berl. Jahrb. V. 184 et Spic. Laur. 117); Fructus adhuc ignoti descriptio haecce: Bacca viridis, 10—15 mm longa, 3—9 mm diam., perfecte ellipsoidea, nitida, pedicello valde coniceque incrassato, perianthii lobis persistentibus satisque auctis coronato plane insidens.

Speciem frequenter in Serra do Curral d'El Rei campis elevatis montanis fructiferam leg. SCHWACKE n. 13423 (herb. Berol.).

Phoebe Tonduzii Mez n. sp.; folia adulta utrinque praeter nervorum primariorum axillas quam maxime barbellatas omnino glabrata, late elliptica, basi breviter nunc brevissime acuta apice breviter acuminata, bene trinervia. Inflorescentia ampla, dense ochraceo-tomentosa, subcorymboso-

panniculata, folia aequans vel paullo superans. Flores dense tomentosi. Limbi segmenta late ovata, subacuta. Filamenta ser. exterior. glabra, antheris breviora. Antherae omnes 4-locellatae. Stylus ovario glaberrimo fere duplo longior.

Arbor sylvestris ramulis novellis perdense ochraceo-tomentellis paullo flocculosis, glabratis badiis, teretibus, gemmis subferrugineo-tomentosis, cortice esipido, adstringenti. Folia petiolis usque ad 20 mm longis, canaliculatis, novellis dense ochraceo-tomentellis mox glabratis praedita, ipsa juvenilia praesertim secus nervos primarios ochraceo-tomentella tum mox glabrata, costarum primariarum axillis semper barbis densis adpressisque subferrugineis auctis, sicca supra olivacea latere inferiore pallida nec albida, \pm 80 mm longa, 45 mm lata, supra vix subtus bene prominulo-reticulata, margine *Ajoucarum* quarundarum ritu incrassata. Inflorescentia pedicellis brevibus (ad 2 mm longis) sensim in flores transeuntibus, bracteolis celeriter deciduis. Flores generis maximi (usque ad 4 mm longi) perianthii tubo brevi, conice in pedicellum transeunte; segmentis aequalibus, ovatis, apice rotundatis. Stamina omnia perfecta antheris ovatis, apicem versus satis angustatis acutiusculis. Staminodia maxima, stipitata, sagittiformia. Ovarium glaberrimum, obovoideum, apice in stylum crassum, subduplo longiorem contractum, stigmata obtuso. Fructus ignotus.

Costarica: ad Copey, alt. 4800 m. Florentem Febuario leg. Tonduz n. 44735. — Incolis »Aguacatillo blanco«. (V. s. in herb. Berol.)

Phoebe Pittieri Mez n. sp.; folia adulta utrinque glabra, elliptico-lanceolata, basi breviter acuta, apice acuminata, penninervia. Inflorescentia dissite pilosa glabrae speciem praebens, perpauciflora, racemosa, foliis multo brevior. Flores minute adpresseque pilosi. Limbi segmenta patentia, elliptica, apice rotundata. Filamenta glabra. Antherae omnes 4-locellatae, ser. ext. breviter lateque ovatae. Stylus ovarium glabrum subaequans.

Arbor parva (ex Tonduz!) ramulis novellis paullo flavido-pilosis subsericeis, adultioribus celerrime glabratis badiis, teretibus, gemmis flavido-tomentellis, cortice amaro mucosoque. Folia petiolis usque ad 10 mm longis, canaliculatis stipitata, supra \pm nitida, ad 70 mm longa, 25 mm lata, utrinque laxe prominulo-reticulata, costis adscendentibus, manifeste rubris, inferioribus in axillis barbellas pilorum brevissimorum subobscuras gerentibus, margine plano. Inflorescentia pedicellis 5—8 mm longis, bracteolis deciduis. Flores albi (ex Tonduz!) perianthii tubo brevissimo, lobis *Nectandrae* ritu explanatis (diam. 6—7 mm); filamentis ser. exteriorum brevissimis; glandulis maximis, globosis, sessilibus; antheris late rotundatis; staminodiis parvis, subcordato-capitulatis, longe stipitatis. Ovarium obovoideum, stylo pererasso, stigmate obtuso. Fructus ignotus.

Costarica: in sylvis ad Copey, alt. 4800 m: leg. Tonduz in herb. inst. phys.-geogr. nat. Costaric. n. 44893 (herb. Berol.).

Ocotea paradoxa Mez n. sp.; folia adulta glaberrima, elliptica, basi brevius longiusve acuta apice breviter nunc brevissime acuminata, penninervia, supra sublaevia vel minutissime subtus manifeste prominulo-reticulata. Inflorescentia pauciflora, racemosa, foliis brevior. Flores hermaphroditi, hirsuti; perianthii tubo subnullo; antheris sessilibus, lineari-lanceolatis optime papillosis; staminibus nullis; ovario glabro, quam stylus longiore.

Arbor vel frutex ramulis summo apice paullo ferrugineo-tomentellis, celerrime glabratibus brunneis, teretibus, gemmis ferrugineo- vel flavido-tomentellis, cortice paullo aromatico. Folia petiolis usque ad 40 mm longis, inciso-canaliculatis, glabris stipitata, sparsa, chartacea, adulta saltem omnino glabra, sicca opaca olivaceo- viridia, \pm 430 mm longa, 65 mm lata, margine subplano. Inflorescentia infra 40-flora, laxa, subcinereo- vel subferrugineo-tomentella; pedicellis 3—40 mm longis, bracteolis deciduis. Flores \pm 42 mm diam. metientes; limbi segmentis *Neelandrae* ritu patentibus, lingulatis, apicem versus sensim angustatis demum rotundatis. Androeceum antheris foliolaceis, connectivo ultra locellos longe producto apice acutis, ser. III. breviter stipitatis glandulis insigniter longe cum filamentis connatis pulvinatis; staminodiis abortivis. Ovarium ovoideum, persensim conice in stylum breviorum productum, stigmate magno, subdiscoideo. Fructus ignotus.

Costarica: in sylvis prope flumen Naranjo, alt. 200—300 m: **TONDUZ** in herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 7648. Floret Martio (herb. Bruxell.).

Obs. Subgeneri *Dendrodaphne* adscribenda et *Ocoteae veraguensi* proxima, insigniter toto habitu, inflorescentia pauciflora racemosaque, floris glandulis differt.

Ocotea pentagona Mez n. sp.; folia adulta glabra, late elliptica vel perobscure obovata, basi brevissime acuta vel nonnunquam fere rotundata, apice acumine minuto latissimoque imposito rotundata, penninervia, utrinque laxe prominulo-reticulata. Inflorescentia permultiflora, ample squarroseque panniculata, sueto folia subaequans. Flores hermaphroditi, glaberrimi: perianthii tubo brevi, suburceolato; antheris quam filamenta glabra duplo brevioribus; staminodiis abortivis. Ovarium glabrum, stylo brevior.

Arbor alta (ex cl. **TONDUZ**!) ramulis quam maxime pentangulatis, novellis minutissime et quasi punctulatum pilis brevissimis pallidis conspersis, celerrime glabratibus fuscobadiis; gemmis paullo flavescenti-pilosis; cortice esipido vel minute tantum aromatico. Folia petiolis percrassis, usque ad 48 mm longis, conspicue canaliculatis, glabris stipitata, sparsa, coriacea vel rigida, novella subtus brevissime tomentella cinerea, sicca pallide viridia, usque ad 520 mm longa, 200 mm lata, sed saepissime minora at semper perconspicua. Inflorescentia in specimine unico (anomalo?) abbreviata in reliquis optime evoluta valde elongata; pedicellis per anthesin ad 3 mm longis tum valde auctis; bracteolis deciduis. Flores 2,5 mm longi; limbi segmentis erectis vel suberectis, late squamiformibus, apice subacutis, antheris subovato-rectangularibus, medio manifeste constrictis, apice rotundatis; staminibus ser. III. basi glandulis binis maximis, subreniformi-globosis, brevissime stipitatis auctis. Ovarium ovoideum, apice conice in stylum permanifeste breviorum transiens; stigmate parvo, obtuso. Bacca optime ellipsoidea, laevis nitidaque, usque ad 17 mm longa, 10 mm diam. metiens, cupulae perianthii lobis optime persistentibus auctisque coronatae, basin versus longe conice attenuatae insidens.

Costarica: ad Rio Naranjo ripas, alt. 200—250 m: **TONDUZ** in herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 7613, in fruticetis prope San Mateo: Biolley ibidem n. 7106, prope Turrialba (370 m): **TONDUZ** ibid. n. 8362. Floret Novembri—Januario, fructificat Martio (herb. Bruxell.).

Obs. A paraffini *O. nicaraguensi* imprimis foliorum forma, inflorescentia glabra distincta.

Ocotea cuneata Mez n. sp.; folia subsessilia, glabra, optime obovata basin versus sensim cuneatimque acuta, apice rotundata, penninervia, supra vix subtus manifeste prominulo-reticulata. Inflorescentia submultiflora, subcorymbose panniculata, folia subaequans vel paullo superans. Flores herma-

phroditi, manifeste ferrugineo-tomentelli; perianthii tubo perlongo, obconico, antheris rectangularibus, truncatis, quam filamenta multo longioribus; staminodiis abortivis. Stylus quam ovarium glabrum subduplo longior.

»Mangle« Costaricensibus (ex cl. TONDUZ!).

Arbor (ex TONDUZ!) ramulis glaberrimis, juvenilibus ut videtur \pm angulatis senioribus teretibus, cinereo-allutaceis, cortice mucoso, aromatico sapore dulci admixto. Folia petiolis lamina basin usque dilatatis sessilia, utrinque subnitida, sparsa, rigida, \pm 150 mm longa, 70 mm lata, sicca olivaceo-viridia. Inflorescentia crasse scoparieque panniculata; pedicellis 0,5—1,5 mm longis, bracteolis deciduis. Flores 2,5—3,5 mm longi; tubo perianthii a pedicello aegre distincto et sensim in eum transeunte; limbi segmentis late ovatis, rotundatis vel acutiusculis; filamentis glabris, ser. III. infime glandulis binis maximis, irregulariter lobato-incisis auctis. Ovarium subglobosum, stigmatibus discoideo. Fructus ignotus.

Costarica: ad Rio Segundo ripas, alt. 2000 m: TONDUZ in herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 1739 et in nemoribus ad Rancho Flores, alt. 2043 m: idem n. 2142. Floret Januario, Febuario (herb. Bruxell.).

Ocotea atirrens Mez et Donnell-Smith n. sp.; folia breviter sed manifeste petiolata, glaberrima, perelongate elliptica, apice abrupte eleganterque acuminata basi breviter acuta, penninervia, utrinque laxè prominulo-venulosa. Inflorescentia non nisi perjuvenilis cognita verisimiliter pauciflora et foliis multo brevior.

Arbor irregularis (ex cl. collectore!) ramulis novellis minutissime perobscureque pilosiusculis 5-angulatis, senioribus teretibus glabratisque, cortice cinereo, mucoso, esipido. Folia petiolis vix ultra 45 mm longis, perprofunde canaliculatis, validis stipitata. sparsa, membranacea vel membranaceo-chartacea, sicca triste olivaceo-viridia, \pm 300 mm longa, 75 mm lata. Flores perjuveniles tantum cogniti hoc in statu pilosi sed per anthesin verisimiliter glabrati, absque dubio hermaphroditi. Bacca maxima (ad 33 mm longa), carnosa, ellipsoidea, cupulae minutae, undulatum simplicimarginatae, clavatum in pedicellum satis incrassatum aeternum transeunt insidens tota exserta.

Costarica: prope Atirro provinciae Carthaginensis, alt. 700 m: J. DONNELL-SMITH n. 4930. Speciem verisimiliter identicam leg. cl. PITTIER (herb. inst. phys.-geogr. Costar. n. 7592^b) prope Rio Maranjo (herb. Bruxell., Mez.).

Ocotea clavigera Mez (Berl. Jahrb. V, 239); speciei adhuc valde imperfecte cognitae adsunt specimina florifera: Inflorescentia ample panniculata, glaberrima, foliis manifeste brevior, pedicellis 4—3 mm longis. Flores virentes (ex cl. Duss!), glaberrimi, 4—4,5 mm longi, vix non hermaphroditi; tubo perianthii brevi; limbi segmentis ovato-lingulatis, subacutis. Androceum filamentis ser. exteriorum latissimis, glabris, quam antherae duplo brevioribus, ser. III. basi glandulis sessilibus instructis; antheris ellipticis vel rectangularibus, medio hand constrictis, apice rotundatis; staminodiis abortivis. Ovarium glaberrimum, subglobosum stylo percrasso aequilongo, stigmatibus discoideo.

Gnadeloupe, in sylvis montanis: Père Duss n. 3484, 3624. »Bois doux, Bois doux grand fenille« inc. — Floret Julio, Augusto (herb. Krug. et Urban, Mez.).

Obs. Habitu *Nectandrae dominicanae* specimina florifera ob foliorum nondum valde induratorum consistentiam satis accedunt. Affinitas vera autem prope *Ocoteam Imrayanam*, *O. Bernoullianam* et differentia specifica a priore dubia.

***Ocotea pedalifolia* Mez n. sp.;** folia membranacea vel membranaceo-chartacea, glaberrima, obovato-elliptica, basi rotundata apice brevissime impositae acuminata, penninervia, utrinque reti tenuissimo prominulo costas *Nectandrae reticulatae* ritu transverse conjungenti insignia. Inflorescentia permultiflora, ample thyrsoidaeo- vel pyramidato-panniculata, quam folia maxima multo brevior. Flores hermaphroditi, minute peradpressequae tomentelli; perianthii tubo conspicuo; filamentis brevissimis glabris; antheris subrectangularibus apice latissime acutiusculis; staminodiis abortivis. Ovarium glabrum, stylo fere duplo longiore. Cupula perianthii lobis quam maxime auctis coronata, turbinatim in pedicellum transiens.

Arbor vel frutex ramulis glaberrimis, junioribus saltem acutissime et fere angulatis pentagonis adultioribus cinereis; cortice esipido, mucoso. Folia petiolis vix ultra 20 mm longis, perprofunde et in sicco marginibus involutis subfistulose canaliculatis stipitata, pedalia vel ultra, 450—200 mm lata (familiae adhuc ex amplissimis), sicca triste olivaceo- vel brunnescenti-viridia, margine plana. Inflorescentia axibus satis angulatis, pedicellis gracillimis, strictis, usque ad 8 mm longis, bracteolis deciduis. Flores minimi (4—4,25 mm longi), perianthii tubo apice haud vel vix constricto; limbi segmentis ovato-ovalibus, acutis. Androeceum perianthio bene brevius; filamentis quam antherae 4—5-plo brevioribus, ser. III. basi glandulis binis magnis, inciso-lobatis, irregularibus, sessilibus auctis. Ovarium ovoideum, in stylum percrassum, subangulatum subito contractum, stigmate obtuso. Bacca elongata, cylindrico-ellipsoidea, ad 20 mm longa, 8 mm diametens, cupulae perconspicuae, 6-lobae, in pedicellum valde incrassatum elongatumque turbinatim transeunti insidens fere omnino exserta.

Costarica: in sylvis prope Shirores, prov. Talamanca, alt. 100 m, leg. PITTIER et TONDUZ in herb. inst. phys.-geogr. Costarica n. 9472, 9479. Floret et fructificat Februario (herb. Bruxell.).

***Ocotea catharinensis* Mez n. sp.;** folia coriacea paullo rigidiuscula, praeter costarum axillas subtus insigniter barbellatas glabra, lanceolata, basi longe acuta apice optime acuminata, penninervia, supra obscurius subtus manifeste prominulo-reticulata. Inflorescentia subracemosa, flavido-pilosa, foliis permulto brevior. Flores hermaphroditi, adpresse pilosi; perianthii tubo conspicuo; filamentis conspicuis, parce pilosis; antheris late ovatis vel ellipticis, apice rotundatis; staminodiis stipitiformibus capitulo parvo imposito. Ovarium glabrum, stylo paullo longiore.

Arbor alta (ex cl. ULE!) ramulis gracilibus, glabris, teretibus, cinereis, gemmis peradpresse ochraceo-tomentellis, cortice aromatico amaroque. Folia petiolis usque ad 40 mm longis, leviter canaliculatis stipitata, sparsa, sicca olivacea subtus opaca pallidiora, supra nitida, \pm 75 mm longa, 25 mm lata, praeter barbellas ad costarum primiarum axillas manifeste foveato-bullata, costis inferioribus erectis superioribus patentibus, margine paullo recurvulo. Inflorescentia perpaucaflora, specie simplex, pedicellis vix ultra 4,5 mm longis, bracteolis deciduis. Flores ad 3 mm longi; tubo perianthii apice haud constricto; limbi segmentis ovatis, acutis; staminodiis ser. IV. parvis, stipitiformibus. Ovarium globosum, subito in stylum crassum teretem contractum, stigmate discoideo. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Sta. Catharina in sylvis prope Blumenau: ULE n. 859. Floret Julio (v. s. in herb. Berol., Vratislav.).

Obs. Speciem inter *O. fasciculatam* et *O. indecoram* collocandam prius e specimine haud satis claris pro *O. indecora* salutavi (Spicil. Laur. p. 424).

Ocotea rubiginosa Mez n. sp.; folia chartacea, adulta supra glabra subtus dissite pilosa, elliptica, basi longe acuminatim acuta apice bene acuminata, penninervia, utrinque sed praesertim subtus prominulo-reticulata. In offcescentia peranguste subglomeratimque panniculata ramulis perabbreviatis subracemosae speciem praebens, dense ferrugineo-tomentella, folia subaequans v. iis paullo brevior. Flores dioici, tomentelli; perianthii tubo subnullo; filamentis in flore ♂ quam antherae elongate rectangulares apice subrotundatae duplo brevioribus, glabris; staminodiis 0. In flore ♀ ovarium glaberrimum, stylo percrasso subaequilongo.

Arbor alta sylvestris vel frutex (ex ULE!) ramulis novellis ferrugineo-tomentellis, glabris cinereis, teretibus, gemmis ferrugineo-tomentellis, cortice esipido. Folia petiolis usque ad 8 mm longis, leviter nunc levissime canaliculatis praedita, sparsa, sicca supra triste olivacea subtus permanente rubiginoso-colorata, utrinque opaca, \pm 60 mm longa, 30 mm lata, costis suberectis, margine recurvulo. Inflorescentia ♂ subpauciflora, ♀ pauciflora, pedicellis haud ultra 4 mm longis, bracteolis deciduis. Flores ♂ 2, ♀ 4,5 mm longi, perianthii tubo subnullo; limbi segmentis ovatis, acutis; glandulis globosis, sessilibus. Gynoeceum in flore ♂ minimum stipitiforme, in flore ♀ stigmatate discoideo-obtusum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Sta. Catharina, prope Blumenau: ULE n. 823 (♂), 834 (♀). Floret Aprili (v. s. in herb. Berol.).

Ocotea inconspicua Mez n. sp.; folia chartaceo-coriacea, juvenilia ad basin minutissime tomentella adulta omnino glabrata, subelliptica vel elliptico-lanceolata, basi acuta apice breviter acuminata, penninervia, supra adulta laevia subtus dense prominulo-reticulata. Inflorescentia perpauciflora, saepius fere simplex, foliis multo brevior, minutissime adpresseque tomentella. Flores dioici, tomentelli. Perianthii tubus brevissimus. Filamenta glabra, quam antherae ovato-rectangulares, apice anguste rotundatae duplo vel ultra breviora. Staminodia 0. In flore ♂ gynoeceum glabrum, crasse stipitiforme vel basi paullo inflatum.

Arbor vel frutex ramulis apice minutissime adpresseque ochraceo-tomentellis, mox glabratibus subatris, teretibus, gemmis tomentellis, cortice esipido. Folia petiolis usque ad 45 mm longis, valde canaliculatis, sparsa, subtus pallidiora nec tamen distincte albida, ad 80 mm longa, 40 mm lata, costis sub angulo \pm 45° e nervo medio prodeuntibus, margine plano. Inflorescentia apicem versus semper simplex, basi ramulis paucis brevibusque praedita specie racemosa, pedicellis vix ultra 4 mm longis, bracteolis deciduis. Flores ♂ tantum cogniti, e majoribus, 3—3,5 mm longi; limbi segmentis late ovatis, apice subrotundatis; filamentis ser. III. basi glandulis binis globosis praeditis. Stigma late obtusum. Fructus ignotus.

Brasiliae civit. Minas Geraes ad Rio Novo: Araujo ap. Glaziov n. 20436 et in herb. Schwacke n. 8914 (v. s. in herb. Berol., Mez).